

FICHA TÉCNICA

SETTER

Sulfato potásico con aminoácidos y molibdeno

Fecundación, cuajado y fructificación de alta calidad.

Riquezas garantizadas (% p/p)

Óxido de Potasio (K ₂ O)	47 %
Aminoácidos libres (Glu)	10 %
Molibdeno (Mo)	0,2 %

Propiedades Físicas y otros componentes

Aspecto	Sólido cristalino blanco
pH en disolución al 1%	7,5 ± 0,5
Solubilidad	Soluble en agua
Elementos característicos	Iones potasio, molibdeno y aminoácidos

Dosis

CULTIVO	FOLIAR	RADICULAR	MOMENTO DE APLICACIÓN	Nº DE APLICACIONES	INTERVALO ENTRE APLICACIONES
HORTÍCOLAS	100-400 g/hL	2-3 kg/ha	Durante todo el ciclo de cultivo.	Variable.	Cada 15 días.
LEÑOSOS	200-300 g/hL	2-3 kg/ha	En fase de: -prefloración -engorde -maduración	2 a 4.	1-2 por estado fenológico*.
SUBTROPICALES	300-400 g/hL	4-6 kg/ha	3 aplicaciones durante: -floración -cuajado	3	10-15 días.

*Si es una sola aplicación, dosis máxima.

Dilución máxima aconsejada

Según dosis de aplicación

Compatibilidades

Incompatibilidades	-
Sustancias tóxicas	No contiene
Biodegradabilidad	Total

Transporte

No ADR