

DISPER FLORUM AG

BIOACTIVADOR PARA LAS ETAPAS DE FLORACIÓN Y CUAJADO

CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN

DISPER FLORUM AG es un bio-activador de origen vegetal diseñado para mejorar el proceso de floración en los cultivos. Está formulado a base de algas marinas (*Ascophyllum nodosum*) y enriquecido con moléculas seleccionadas específicamente para favorecer la etapa de floración-cuaje, incluyendo aminoácidos libres específicos, sacáridos, vitaminas de origen vegetal, y micronutrientes cuidadosamente seleccionados (Zn, B y Mo).

DISPER FLORUM AG mejora la floración y cuaje de los frutos, incrementa la fertilidad del polen y la fecundación, minimiza el número de abortos florales así como la abscisión prematura de flores o de frutos recién cuajados y reduce el estrés ambiental durante la etapa de floración, optimizando el rendimiento y calidad del cultivo.

EL EFECTO DE DISPER FLORUM AG

Algas marinas (*Ascophyllum nodosum*):

Proporcionan a la planta un complejo de elementos que estimulan el cultivo en uno de sus momentos más críticos: apertura de la flor, germinación del polen y cuaje del fruto.

Aminoácidos libres:

- Mejoran la germinación del polen y lo protegen frente a fitotoxicidades.
- Fortalecen las paredes celulares, aumentando la resistencia a heladas.
- Favorecen el metabolismo del ácido giberélico.

Micronutrientes específicos:

- Zinc (Zn): Regula el crecimiento y participa en la síntesis auxínica.
- Boro (B): Es esencial para el desarrollo del tubo polínico y la fecundación.
- Molibdeno (Mo): Favorece la producción de polen.



VENTAJAS EN:
• TRANSPORTE
• ALMACENAJE
• RESIDUOS



GRÁNULOS SOLUBLES EN AGUA
CON TECNOLOGÍA FLUID BED



DISPER FLORUM AG

FICHA TÉCNICA



COMPOSICIÓN (% p/p)

Aminoácidos libres.....	9.10 %
Nitrógeno total (N).....	5.00 %
Nitrógeno orgánico (N).....	4.27 %
Ácido algínico.....	3.00 %
Manitol.....	1.58 %
Boro (B) soluble en agua.....	1.00 %
Molibdeno (Mo) soluble en agua.....	0.30 %
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado con EDTA..	1.65 %



TIPO DE FORMULACIÓN

DISPER FLORUM AG está formulado en GRÁNULOS totalmente solubles en agua, de fácil manipulación, pudiéndose utilizar tanto en pulverización como en todo tipo de sistema de riego, ya que está exento de polvo y no forma grumos.



APLICACIONES



DISPER FLORUM AG resulta de gran utilidad en cultivos en los que la etapa de floración-cuaje es crítica, incluyendo hortalizas de fruto, frutales (leñosos en general) y ornamentales. Se recomienda su uso desde la prefloración. También puede aplicarse en casos de estrés para activar y favorecer el metabolismo de la planta.



DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Pulverización: realizar 1-3 aplicaciones de 50-200 g/100 L de agua, con intervalos de 7-10 días.

Vía Radicular: realizar 2-3 aplicaciones de 1-2 kg/ha, con intervalos de 7-10 días.

La dosis y el momento de aplicación del producto debe ser establecida en cada caso por el Dpto. Técnico. Se ha de asegurar un correcto cierre del envase tras la aplicación si aún queda contenido en él.



COMPATIBILIDAD EN MEZCLAS

No mezclar con productos que den reacciones muy ácidas ni con aceites. Tener precaución en mezclas con productos que contengan cobre y calcio. El pH de DISPER FLORUM AG es 8 (sol. 1%). En mezclas con fitosanitarios u otros productos bioestimulantes, emplear dosis bajas-medias.



Envasado en ATMÓSFERA CONTROLADA

Control de la humedad para una mejor conservación del producto

