

REMOVES ECO

ABONO CE

SOLUCIÓN DE ABONO A BASE DE MANGANESO (Mn)

REMOVES ECO es un abono líquido de aplicación foliar, particularmente indicado para la prevención y corrección de la carencia de manganeso.

El contenido de manganeso potencia el papel del mismo, en los procesos de fosforilación y respiración, acentuando la capacidad de síntesis de la clorofila.

Esta composición tiene una excelente efectividad en el lavado de mielato causado por los insectos.

CONTENIDO DECLARADO

Manganeso (Mn) soluble en agua

4% P/P

MODO DE APLICACIÓN pH de aplicación de 5 a 5.5

REMOVES ECO se puede aplicar junto con otros agroquímicos, sin embargo es recomendable hacer una prueba previa de miscibilidad. Aplicar en los momentos de máxima temperatura del día.

No mezclar ni con ácidos fuertes ni con bases fuertes, ni con productos que contienen azufre.

DOSIS

Uso foliar en cualquier cultivo, especialmente en hortalizas, cítricos y frutales, a la dosis de 2-3 Kg/ha.

Repetiendo la aplicación cuando sea necesario con un intervalo de 10-20 días.

REMOVES ECO se deberá aplicar en los momentos de máxima radiación solar, y con temperatura superior a 22° C.

REMOVES ECO debe aplicarse con un pH en la disolución final de 5 a 5.5. En el supuesto que el pH de la disolución sea superior podemos ajustarlo añadiendo 100 cc. de **TRANSPORT TNF** y comprobando nuevamente el pH, ajustándolo nuevamente si fuera necesario.

RECOMENDACIONES

En general **REMOVES ECO** se puede aplicar junto con otros fertilizantes y fitosanitarios.

Realice primero una prueba, en un recipiente, empleando las proporciones adecuadas a su caso particular, para establecer la compatibilidad física de los productos.

No mezclar con ácidos o bases fuertes inorgánicas, ni con productos que contengan un alto contenido de azufre (S) o cobre (Cu). Si bien se puede aplicar junto con aceites, recomendamos reducir la dosis de aceite en un 50 %.

VENTAJAS

REMOVES es un producto formulado con manganeso aportado a la planta de manera muy fácilmente asimilable. Se trata de una especial formulación de manganeso a la que se ha mejorado su poder de penetración y asimilación tanto vía foliar como radicular. Esto garantiza la selectividad y afinidad de estos complejos de manganeso. El manganeso (Mn) es un importante micronutriente para las plantas y, después del hierro, es el que las plantas requieren en mayor cantidad. Al igual que sucede con cualquier otro elemento, su deficiencia o su toxicidad pueden representar una limitación para el desarrollo de las plantas. En varias formas se asemeja al hierro, por lo que su deficiencia o su toxicidad suelen ser confundidas con las de este.

CERTIFICADO POR:



5L
20L
1000L

FABRICANTE:
Técnica Nutricional Foliar, S.L.
Pol. Ind Pont C/Costa Rica, 39
B-12.576.971
info@tnfcarbocalidad.eu
www.tnfcarbocalidad.eu
CABANES Castellón (España)




MÉTODO CARBOCALIDAD

¿Cómo aplicamos el método?

El método se aplica **dependiendo de la fase fenológica** en la que se encuentre la planta y **los objetivos que queremos desarrollar** en la misma. Es importante **mantener un seguimiento** para poder guiarla correctamente a través de todo el proceso.



LLENADO DE YEMAS

**Método:**

Transport TNF + Urea = Citoquininas


Objetivos:

Buscamos determinar y concentrar la brotación y floración, de esta etapa depende que nuestra campaña sea prospera en calidad, cantidad y vida útil del fruto.

Buscaremos:

Yemas gorditas y diferenciadas.

BROTACIÓN

**Método:**

Transport TNF + Urea = Citoquininas

Transport TNF + Sulfato = Giberelinas

Transport TNF + Nitrato = Auxinas

Objetivos:

Control de entrenudos, tamaño y grosor de las hojas, aumento del nivel fotosintético y aumento de grosor y ceras en hojas y tallos.

Buscaremos:

Una brotación uniforme y concentrada en el tiempo.

Sinergia:

TNF K22 ECO: Nos ayudará a madurar de plastidios a cloroplastos consiguiendo una hoja más oscura.

Calion ECO: Acelerador del ciclo de Krebs.

BOTÓN FLORAL

**Método:**

Transport TNF + Urea = Citoquininas

Transport TNF + Sulfato = Giberelinas

Objetivos:

Esta etapa es crucial para obtener una producción óptima, lo conseguiremos induciendo Citoquininas para una máxima multiplicación celular y Giberelinas para un elongamiento celular.

También buscaremos inhibir el crecimiento vegetativo para favorecer el crecimiento generativo.

Buscaremos:

Botones florales en crecimiento.

Sinergia:

TNF K22 ECO: Nos ayudará a madurar de plastideos a cloroplastos consiguiendo una hoja más oscura.

TNF Boro ECO: Favorecer la generación de celulosa.

FLORACIÓN

**Método:**

Transport TNF + Urea = Citoquininas

Transport TNF + Sulfato = Giberelinas

Objetivos:

Debemos mantener la flor como sumidero o "Sink" principal, haciéndola fuerte y duradera en el tiempo.

Buscaremos:

Flor de su color natural con gran tamaño y pétalos muy sedosos, un stigma grande y antenas potentes con mucho polen.

LLENADO DE FRUTO

**Método:**

Transport TNF + Urea = Citoquininas

Transport TNF + Sulfato = Giberelinas

Transport TNF + Nitrato = Auxinas

Objetivos:

Debemos aportar todos los nutrientes esenciales para nuestra planta, iniciar la producción de aminoácidos llenadores (Auxinas), formación de ceras (Giberelinas) y mantener equilibrada la parte productiva y vegetativa (Citoquininas).

Buscaremos:

Un notable crecimiento semanal del fruto, fruto ceroso y veremos la hoja grande, cerosa y oscura con un alto nivel fotosintético.

Sinergia:

Calion ECO: Acelerador de ciclo de Krebs.

Energitec: Formación de ATP (adenosín trifosfato).

TNF K22 ECO: Aclareo Químico*.

AUXI MAR TNF

PRE-COSECHA

**Método:**

Transport TNF + Sulfato amónico = Giberelinas

Objetivos:

Potenciar la formación de azúcares, aromas, sabor y brillo.

Buscaremos:

Un calibre adecuado y una fruta con brillo, dulzor y un olor excelentes, en definitiva una planta lista para cosechar buscando siempre calidad y cantidad.

Sinergia:

Madurnat TNF: Aumento de calibre, formación de ceras y color.

TNF K22 ECO: Nos ayudará a madurar de plastidios a cloroplastos consiguiendo una hoja más oscura.

Energitec: Formación de ATP (adenosín trifosfato).